

Нэмэлт вакцины тун хоорондох хугацааг богиносгох, 30-аас доош насныханд "Файзер" вакцин хийлгэхийг зөвлөмж болгож байна.

Хүндэрч нас барах эрсдэлийг харгалзан нэмэлт вакцины тун(booster shot) хоорондох хугацааг богиносгох.

Хамрагдах бүлэг	Зөвлөмж болгож буй вакцины тун хоорондын зай	
	Одоо мөрдөж байгаа	Өөрчлөлтийн дараа
60-аас дээш настай	6 сар	4 сар
Халдварт өртөмтгий байгууламжид байрлаж байгаа болон ажиллаж буй хүмүүс		
Сувилахуйн эмнэлэг, байгууламжид хэвтэж эмчлүүлэгч байрлагч ажилтан		
Суурь өвчтэй өвчтөнүүд (18-59 нас)		
Эмнэлэг, эмнэлгийн байгууллагын ажилчид	6 сар	5 сар
50-аад настай хүмүүс		
Нэн түрүүнд вакцинжуулалтад хамрагдах шаардлагатай ажил, мэргэлжилийн хүмүүс ²⁾	2 сар	2 сар(өөрчлөлт ороогүй)
Янсэн вакцин хийлгэсэн хүмүүс		
Дархлаа султай хүмүүс ³⁾		

1) Ахмад настны байгууламж(орон сууц, өдөр/шөнө, богино хугацааны асран хамгаалах), Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн байгууламж(оршин суух, өдрийн асран хамгаал агч), Ахмад настны нийтийн асрамжийн газар, Сүрьеэ, уяман өвчтөний байгууламж, Орон гэргүй хүмүүсийн оршин суух болон ашигладаг байгууламж

2) Цэрэг, Цагдаа, Гал түймэртэй тэмцэгч, Тэнгисийн Цагдаа, Эрүүл мэндийн ажилтан, Тусгай асрамжийн газар, Цэцэрлэг, сувилахуйн ажилтнууд, Тусгай боловсрол, Эрүүл мэндийн багш, Засан хүмүүжүүлэх байгууламж, ажилчид, Онгоцны үйлчлэгч гэх мэт.

3) Цусны цагаан бөөм, дархлааг дарангуйлах эмчилгээ хийлгэж буй өвчтөн гэх мэт.

◦ Захиалга хийх хүн нь вакцин хийлгэх боломжтой хугацаанаас 2 долоо хоногийн өмнө корона19 вакцинжуулалтын урьдчилан захиалгын вэб сайтаас (<https://ncvr.kdca.go.kr>) захиалга хийх боломжтой(11.22(даваа гариг) хойш) 12.6 өдөр(даваа гариг) хойш вакцин хийлгэх өдрийг сонгох боломжтой.

◦ Захиалгын хугацаа болоход хувь хүн бүрт **мессежээр хамрагдах хүнийг шалгах бол**

он захиалга хийх зааврыг танилцуулна.

- 30наснаас доош (92.1.1 хойш төрсөн) үндсэн 1,2 дахь вакцин хийлгэх тохиолдолд Файзер вакцин санал болгож байна.
- Зарим оронд Модэрна вакцинаас үүдэлтэйгээр зүрхний булчингийн үрэвсэл, перикардит(зүрхний үнхэлцэгний өрөвсөл) үүсэх нь Файзер вакцинаас өндөр
- Шатчилан хэвийн амьдралд шилжсэний дагуу корона19 эрсдэлийн дүгнэлт
- Эмнэлэгийн арга хэмжээний чадавхид голлож янз бүрийн үзүүлэлтүүдийн эрсдэлийн цогц дүгнэлтэд үндэслэн хэвийн амьдралд шилжих үе шат эсвэл яаралтай төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх зэрэг арга хэмжээ
- Долоо хоног бүр дүгнэж 4долоо хоногийн дүгнэлтийн дараа хэвийн амьдралд шилжих арга хэмжээ авах талаар шийдвэр гаргана.

<Энэхүү орчуулагыг Данүри төв 1577-1366 хийсэн болно>